

ZUGELASSENE ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN:

In Österreich:	2. Indikation:
Einsatzgebiet:	Zum Vorratsschutz in leeren Lagerräumen vor Beginn der Einlagerung, bei Befall spritzen.
Aufwandmenge gegen Insekten:	30 ml/100 m ² bei glatten Oberflächen, 60 ml/100 m ² bei porösen Oberflächen.
Wasseraufwandmenge:	3,3–5 l/100 m ² . Max. 1 Anwendung.

In Deutschland:	2. Indikation:
Einsatzgebiet:	Vorratsschutz
Anwendungsbereich:	in leeren Räumen
Kultur/Objekt:	Vor der Einlagerung (Einsatz in leeren Räumen)
Schadorganismus/Zweck:	Insekten (als Vorratsschädling)
Stadium Schadorganismus:	Von Larve bis Imago
Anwendungszeitpunkt:	bei Befall
Max. Zahl Behandlungen:	In der Anwendung: 1. In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:	spritzen
Aufwand:	bei glatten Oberflächen 30ml/100 m ² in 3,3 bis 5 l/100 m ² Wasser; bei rauen Oberflächen 60ml/100 m ² in 3,3 bis 5 l/100 m ² Wasser
Weitere Erläuterungen:	Schutzdauer bis zu 3 Monaten
Wartezeiten:	In leeren Räumen: Vorratsschutz Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.